



DI News

関田会 ときわ病院 薬剤科
2023年度 第2号



今回の内容は…

1. 薬剤科情報
2. 新規採用薬品紹介
3. 問い合わせコーナー
～テリパラチド皮下注～

1. 薬剤科情報

●3月末の棚卸にご協力いただき、ありがとうございました。
これからも、期限切れ薬品の管理等お力添えよろしくおねがいいたします。

1 病棟	大野/濱崎
2 病棟	淡野/彦坂
3 病棟	小村/三木
4 病棟	小村/三木

●5月より、薬剤師の担当病棟が変更になりました！
従来通り、患者様への服薬指導を行っていきます。それに加え、各病棟、薬剤的関与の必要な患者様のカンファレンスを中心に参加していきます。ポリファーマシーの改善や、退院後のお薬の管理について関わっていかれたらと思っています。

●電子カルテ掲示板でもお伝えした通り、2023年4月11日(火)より、処置前・術前休薬表が新しいものに改定されました。確認がまだの関係部署の方は、電子カルテ上の薬剤関係ランチャーの中にある、休薬関係ファイルを参照ください。

2. 新規採用薬品紹介

アルコール消毒で手が荒れる方向けに採用されました！現在、手術室でのみ使用されています♪



●0.1%ヘキサック水 W 液 500mL (成分名;クロルヘキシジングルコン酸塩)

(特徴)

皮膚に対する刺激が少なく、臭気がほとんどない生体消毒薬であり、適用時に殺菌力を発揮するのみならず皮膚に残留して持続的な殺菌作用を発揮する。

手術時手洗い、手術部位の皮膚、血管内留置カテーテル挿入部位の皮膚などにおいて優れた特性を発揮する。
日本では、結膜嚢以外の粘膜への適用は禁忌であり、また結膜嚢の洗浄後も滅菌水での洗浄が必要とされている。

(抗微生物スペクトル)

グラム陽性菌、グラム陰性菌、真菌の一部、エンベロープを有するウイルスの一部に有効であるが、結核菌、多くのウイルス、芽胞には無効である。手指・皮膚、手術部位の皮膚、医療機器に対しては、適用範囲 0.1～0.5 %
結膜嚢に対しては、適応範囲 0.05%以下 (他にも適応あり)

(禁 忌)

- (1)クロルヘキシジン製剤に対し過敏症の既往のある者
- (2)脳、脊髄、耳 (3)膣、膀胱、口腔等の粘膜面 (4)眼(5W/V%液)

(その他の注意)

- ・水道水や生理食塩水で希釈すると沈殿を起こし、殺菌力が低下する。
- ・日光により着色するので遮光容器にて保存する。開封後は汚染に注意して使用する。



3. 問い合わせコーナー



問い合わせの多い内容をご紹介します！

今月のテーマは「テリパラチド皮下注」について★

院内採用薬のテリパラチド皮下注(先発薬フォルテオ)について、最近実際に薬剤科へ問い合わせがあった内容をまとめました。

Q.テリパラチドを常温で放置してしまった…

テリパラチド注を冷蔵庫に入れるのを忘れていました。
どうしたらいいですか？もう使用できないのでしょうか？



A.放置時間と室温によって変わります！

1本を使い切る 28 日目までに、室温 25℃以下の場合、合計 36 時間までは、室温に出していても OK です！ただし、原則持ち運びは保冷ポーチを使用し、専用保冷剤を使用してください。



Q.テリパラチドをいつもの時間に打ち忘れた…

毎朝使用しているテリパラチド注を今朝打ち忘れてしまった。
今日中に打ったらいいのか？それとも、今日はもう打たずに明日打てばいいのか？



A.次回までに12時間以上あけてください！

毎朝、施注されている患者さんの場合、打ち忘れた日の夜にでも使用することは可能です。ただし、その次の使用までに12時間以上は間隔をあけるようにしてください。



ご意見・ご要望・ご質問等ありましたら、お気軽に薬局 PHS(631/632)までお電話ください*